

بررسی مقایسه سطح هیدروکسی دی اکسی گوانوزین در بزاق بیماران با استوماتیت آفتی راجعه و افراد سالم

ندا امید پناه^{۱*}، جلیل مومن بیت الهی^۲، محمد گودرزی^۳

^۱ استادیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

^۲ استادیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

^۳ دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

تاریخ ارائه مقاله: ۹۶/۵/۲۹ - تاریخ پذیرش: ۹۷/۶/۱۸

Comparison of 8-Hydroxy Deoxyguanosine Level in the Saliva between the Patients with Recurrent Aphthous Stomatitis and Healthy Individuals

Neda Omidpanah^{1*}, Jalil Momen-Beitollahi², Mohamad Goodarzi³

¹ Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

² Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

³ General dentist, School of Dentistry, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

Received: 20 August 2017; Accepted: 9 September 2018

Introduction: Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) is a product of DNA damage. Considering the role of oxidative stress in the etiopathogenesis of recurrent aphthous stomatitis, the present study aimed to evaluate the DNA damage caused by oxidative stress in these patients.

Materials and Methods: This case-control study was conducted on 30 patients with recurrent aphthous stomatitis and 30 healthy subjects. The subjects were matched in terms of age and gender. The inclusion criteria for enrollment were the absence of systemic diseases, no drug use, no tobacco and alcohol use, and no use of antioxidant supplements for the past 3 months. The inclusion criterion for recruitment in the study groups was the presence of a recurrent aphthous ulcer for a minimum of three times per year. Unstimulated saliva sampling was performed. Data were analyzed by t-student.

Conclusion: No significant difference was observed between the patients with recurrent aphthous stomatitis and healthy subjects regarding the level of 8-OHdG ($P=0.427$).

Key words: 8-OHdG, Recurrent Aphthous Stomatitis, Saliva, Oxidative Stress

*Corresponding Author: nomidpanah@kums.ac.ir, n.omidpanah@yahoo.com

J Mash Dent Sch 2019; 42(4): 278-84.

چکیده

مقدمه: با توجه به مطرح شدن نقش استرس اکسیداتیو در اتیوپاتوژنز استوماتیت آفتی راجعه، هدف مطالعه بررسی صدمه استرس اکسیداتیو به DNA را در این بیماری بود. محصول استرس اکسیداتیو به 8-OHdG -ADNA هیدروکسی داکسی گوانوزین (8-OHdG) می باشد.

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع موردی-شاهدی (Case/control) می باشد. ۳۰ بیمار مبتلا به استوماتیت آفتی راجعه و ۳۰ فرد سالم که از نظر سن و جنس با هم همسان شده بوده اند، انتخاب شده اند. معیارهای ورود به مطالعه شامل نداشتن تاریخچه بیماری سیستمیک، نگرفتن دارو، عدم استعمال سیگار و الکل و عدم استفاده از مکمل آنتی اکسیدان در ۳ ماه گذشته بود. معیار ورود به گروه مورد عود حداقل سه بار در سال آفت بود. جمع آوری بزاق به صورت غیر تحریکی و تحلیل آماری با آزمون t-student انجام شد ($P=0/05$).

یافته ها: در این مطالعه در هر یک از دو گروه مورد و شاهد ۶۳/۲ درصد زن و ۳۶/۷ درصد مرد وجود داشت. میانگین و انحراف معیار سطح 8-OHdG هیدروکسی داکسی گوانوزین بزاق بیماران در گروه بیماران ۱۲/۷۷±۳۸/۸۴ و در افراد سالم ۱۱/۷۸±۴۱/۲۸ بود که تفاوت معنی داری نداشتند. سطوح 8-OHdG هیدروکسی داکسی گوانوزین بزاق بیماران با استوماتیت آفتی راجعه و افراد سالم تفاوت آماری معنی داری نداشت ($P=0/427$).

کلمات کلیدی: 8-OHdG - هیدروکسی داکسی گوانوزین، استوماتیت آفتی راجعه، بزاق، استرس اکسیداتیو.

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال ۱۳۹۷ دوره ۴۲ / شماره ۴: ۲۷۸-۸۴.

* مؤلف مسؤول، نشانی: کرمانشاه، خیابان شریعتی، دانشکده دندانپزشکی، تلفن: ۰۹۱۸۸۳۹۵۷۵۱

E-mail: nomidpanah@kums.ac.ir, n.omidpanah@yahoo.com

مقدمه

استوماتیت آفتی راجعه (Recurrent aphthous stomatitis) یکی از شایعترین زخم‌های التهابی و عودکننده حفره دهان است.^(۱) که شیوع آن بین جمعیت‌های مختلف از ۲ تا ۶۶ درصد گزارش شده است.^(۱-۲) افراد مبتلا معمولاً ۴-۲ بار در سال دچار آفت می‌شوند که پس از ۸-۵ روز هم بهبود می‌یابد.^(۳) ضایعات آفتی بر طبق طبقه‌بندی Stanley به ۳ شکل مختلف دیده می‌شوند: زخم‌های آفتی مینور، زخم‌های آفتی مازور و زخم‌های هرپتی فرم^(۴)؛ زخم‌های آفتی مینور ۸۰ درصد ضایعات را تشکیل می‌دهند.^(۵)

اتیولوژی RAS ناشناخته است. ولی عوامل مستعدکننده زیادی شانس ابتلا به این بیماری را افزایش می‌دهند. در پزشکی مدرن، فاکتورهایی مثل ارث، بیماری‌های میکروبی دهان، اینورمالیتی ایمونولوژیک، اختلالات میکرو واسکولار، کمبود عناصر معدنی، دیسکرازی اندو کرین و دیسفانکشن معده‌ای-روده‌ای، در ارتباط با RAS شناخته شده است.^(۶-۹) این فاکتورها می‌تواند تعادل سیستم آنتی اکسیدان را بهم بزند و تشکیل رادیکال‌های آزاد را تسریع کند.^(۱۰)

رادیکال‌های آزاد مولکول‌هایی با یک جفت الکترون جفت نشده می‌باشد که قادرند در سلول تغییرات شیمیایی گوناگون ایجاد کنند و به پروتئین‌ها، لیپیدها، کربوهیدرات‌ها و نوکلئوتیدها در بافت صدمه بزنند.^(۱۱،۱۲) رادیکال‌های آزاد همراه با یون‌های فلزی می‌توانند به زنجیره DNA باند شوند و به طور مستقیم با اسیدهای نوکلئیک وارد واکنش شده و باعث صدمه به DNA و شکست آن شوند که ممکن است نتایج موتاژنیک داشته باشد. اثر دیگر رادیکال آزاد بر DNA فعال شدن سیستم‌های متابولیک خاص به عنوان مثال اندونوکلائز وابسته به کلسیم است که باعث شکاف زنجیره DNA

می‌شود. DNA صدمه دیده ایمونوژنیک می‌شود و باعث تولید اتو آنتی‌بادی می‌گردد.^(۱۳) سطح ۸-هیدروکسیداکسی گوانوزین (8-OHdG) برای ارزیابی صدمه DNA استفاده شده است. این امکان هست که سیتوتوکسیته از طریق اکسیداتیو استرس بوسیله کشف 8-OHdG اثبات شود. بنابراین از آن به عنوان بیومارکر صدمه اکسیداتیو استفاده شده است.^(۱۴)

مطالعات مختلف با بررسی سطح 8-OHdG در مایعات بدن نظیر ادرار، پلاسما و بزاق، افزایش آن را در شرایط پاتولوژیک مختلف مانند سرطان‌ها^(۱۵-۱۷)، بیماری‌های عصبی^(۱۸،۱۹)، دیابت^(۲۰،۲۱)، آلزایمر^(۲۲)، بیماری‌های قلبی-عروقی و صدمات ایسکمیک^(۲۳-۲۴) و شرایط التهابی مزمن^(۲۵) نشان داده‌اند. بعضی از انواع بیماری‌های التهابی، مخصوصاً بیماری‌های پریدنتال، در ارتباط با کاهش شرایط آنتی اکسیدان بزاقی و افزایش صدمه اکسیداتیو در داخل حفره دهان می‌باشد.^(۲۶)

در بدن سیستم‌های خاصی برای مقابله با آسیب‌های حاصل از رادیکال‌های آزاد وجود دارند که به نام سیستم آنتی اکسیدان معروف‌اند. بزاق به عنوان اولین خط دفاعی علیه رادیکال‌های آزاد عمل می‌کند و به عنوان یک وسیله تشخیصی برای بسیاری از بیماری‌های سیستمیک و دهان مطرح است.^(۲۷) مطالعات زیادی ارتباط بین اکسیداتیو استرس و شیوع RAS را گزارش کردند. Saral و همکارانش^(۲۸) نشان دادند که قابلیت آنتی‌اکسیدان غیرآنزیمی (ویتامین‌های E, C, A) در بزاق مبتلایان به RAS در مقایسه با افراد سالم پایین‌تر اما سطوح MDA (محصول صدمه استرس اکسیداتیو به لیپیدها) در مقایسه با گروه شاهد بالاتر بود. Babae و همکاران^(۲۹) در بیماران با RAS سطح بزاقی MDA را به طور قابل توجهی بالاتر از افراد سالم گزارش کردند.^(۲۹) Karin caoalu و

حداقل ۵ سی سی بزاق غیرتحریکی جمع‌آوری شد. نمونه‌ها تا زمان آنالیز در یخچال با دمای ۲۰- درجه سانتیگراد نگهداری شدند. بعد از انتخاب ۳۰ فرد مبتلا به استوماتیت آفتی راجعه، ۳۰ فرد سالم نیز انتخاب شدند. هر فرد شاهد، به صورتی که از نظر سن و جنس مشابه یکی از افراد گروه مورد باشد انتخاب می‌شد. به این ترتیب دو گروه شاهد و مورد از نظر سن و جنس به صورت جفتی همسان شدند. بزاق‌های جمع‌آوری شده در (دور) ۲۰۰g برای ۱۰ دقیقه ساتریفیوژ شدند. مایع شناور در ۲۰°C تا زمان آنالیز نگهداری شد. بررسی ایمونوآنزیمومتریکی برای اندازه‌گیری ۸-هیدروکسیداکسی گوانوزین با استفاده از کیت الیزا (USA, Michigan, AnnArbor) انجام شد. سطح 8-OHdG بزاقی براساس دستورالعمل کارخانه سازنده تعیین شد. در این روش از آنتی بادی مونوکلونال با اختصاصیت بالا به عنوان آنتی بادی اولیه استفاده شد، توسط کیت الیزا رقابتی اندازه‌گیری انجام شد. مقدار 8-OHdG به صورت نانوگرم/میلی‌لیتر اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز شد. تفاوت در سطوح 8-OHdG بین گروه مورد و کنترل با استفاده از Paired T-test ارزیابی شد. تفاوت معنی‌دار کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد ($P < 0/05$).

یافته‌ها

در این مطالعه ۶۰ فرد (۳۰ بیمار مبتلا به افت و ۳۰ فرد کنترل سالم) مورد بررسی قرار گرفتند؛ که شامل ۱۹ زن و ۱۱ مرد بودند که طیف سنی بین ۶۰-۲۴ سال داشتند (متوسط سن: ۳۷ سال)؛ دو گروه از نظر سن و جنس کاملاً همسان بودند. نتایج حاصل از مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS با ویرایش ۱۱/۵ به دست آمد. نتایج حاصل از مطالعه نشان می‌داد که میزان 8-OHdG در گروه بیماران

همکاران^(۳۰) با بررسی آنزیم‌های آنتی اکسیدان بزاقی بالا بودن سطوح سوپراکسید دسموتاز، کاتالاز و پاپین تر بودن سطوح گلوکوتایون پراکسیداز را در مبتلایان به RAS نسبت به افراد سالم گزارش کردند. در این مطالعه بر آن شدیم که اثر استرس اکسیداتیو بر DNA در RAS را ارزیابی کنیم.

مواد و روش‌ها

در مجموع ۶۰ نفر در این مطالعه مورد-شاهدی شرکت داده شدند. نمونه‌ها شامل ۳۰ بیمار مبتلا به استوماتیت آفتی راجعه به عنوان گروه مورد و ۳۰ فرد سالم به عنوان گروه کنترل مراجعه‌کنندگان به بخش بیماری‌های دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شده‌اند. افراد از نظر سن و جنس همسان شده بودند. مطالعه توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تهران تایید شد. پس از توضیح پروتکل مطالعه برای همه شرکت‌کنندگان، رضایت‌نامه کتبی آگاهانه از هرکدام از شرکت‌کنندگان اخذ شد.

معیارهای ورود به مطالعه شامل تاریخچه کلاسیک آفت (عود ۳ بار در سال) و زخم راجعه دهانی براساس تاریخچه و یافته‌های بالینی بیمار و معیارهای خروج از مطالعه شامل وجود هرگونه بیماری سیستمیک یا مصرف هرگونه داروی سیستمیک، مصرف سیگار و الکل، مصرف مکمل تغذیه‌ای در ۳ ماه گذشته، وجود هرگونه ضایعه دهانی یا مخاطی و پوستی دیگر و وجود بیماری پریدنتال بود.

اطلاعات دموگرافیک، تاریخچه کامل پزشکی و تاریخچه بیماری در پرسشنامه ای ثبت شد. نمونه‌گیری از بیماران بین ساعت ۹ صبح و ۱۳ بعد از ظهر با استفاده از روش Spiting انجام شد. از بیمار درخواست شد که ۹۰ دقیقه از خوردن و آشامیدن اجتناب کند. سپس میزان

مبتلا به آفت و افراد کنترل تفاوت معنی دار آماری نداشت ($P=0/427$).

جدول ۱: میانگین و انحراف معیار هیدروکسی داکسی گوانزین 8-OHdG بین استوماتیت افتی راجعه و افراد سالم

P-value	کنترل	استوماتیت افتی راجعه
	انحراف معیار \pm میانگین	انحراف معیار \pm میانگین
0/427	41/28 \pm 11/78	38/84 \pm 12/77

بحث

با وجود آنکه آفت دهانی شایعترین زخم التهابی در داخل حفره دهان است ولی اتیولوژی آن همچنان ناشناخته است. به طور کلی در شرایط التهابی میزان استرس اکسیداتیو در بدن افزایش می یابد. خوشبختانه سلول برای مقابله با این اثرات مضر استرس اکسیداتیو می تواند فاکتورهای دفاع گوناگون خود را افزایش دهد. مثالهای شایع فاکتورهای دفاع اکسیداتیو شامل گلوکوتایون، سوپراکسیددسموتاز، کاتالاز، NADPH دهیدروژناز و ... است.^(۳۱ و ۳۲) به هر حال اگر فاکتورهای دفاعی غیر کافی یا فاکتورهای آسیب رسان غالب باشند بیماری می تواند اتفاق بیفتد.

جمع آوری بزاق، آسان، غیرتهاجمی و کم هزینه است. در مطالعات متعدد انواع ترکیبات بزاقی به عنوان مارکر بیماری ها مورد بررسی قرار گرفته اند. ارزیابی وضعیت استرس اکسیداتیو در مایع بزاق می تواند به عنوان یک روش برای تشخیص، پیگیری و درمان برخی از بیماری ها باشد.^(۳۳) تغییرات سطح آنتی اکسیدان بزاق در بیماری های دهانی و سیستمک از جمله بیماری های پریدنتال^(۳۴)، پوسیدگی دندان^(۳۵)، لیکن پلان^(۳۶) و لوپوس اریتماتوز^(۳۷) گزارش شده است.

در مطالعه حاضر 8-OHdG بزاقی در بیماران با RAS و افراد سالم مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق جستجوی انجام شده اندازه گیری صدمه استرس اکسیداتیو به پروتئین و لیپیدها انجام شده است ولی مطالعه ای که صدمه استرس اکسیداتیو به DNA را ارزیابی کرده باشد در دسترس نبود. بنظر می رسد مطالعه موجود از اولین موارد بررسی تغییرات 8-OHdG در بیماران آفتی باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین 8-OHdG بزاقی بیماران افتی و سالم تفاوتی وجود ندارد. همچنین Caglyan و همکاران^(۳۷) تفاوت قابل توجهی از نظر ظرفیت آنتی اکسیدان، شاخص استرس اکسیداتیو و فعالیت میلوپراکسیداز بین مبتلایان به RAS و افراد سالم نیافتند و به این نتیجه رسیدند که استرس اکسیداتیو در بروز RAS اثر ندارد. Momen-Beitollahi و همکارانش^(۳۸) تفاوت معنی داری از نظر ظرفیت آنتی اکسیدان بزاقی در دو گروه RAS و افراد سالم پیدا نکردند.^(۳۸)

Khademi و همکاران^(۳۹) نیز مقدار مالون دی الدهید (MDA) و ویتامین های آنتی اکسیدان E, C, A بزاق در دو گروه RAS و افراد سالم را مشابه گزارش کردند.

Guler و همکاران^(۴۰) در مطالعه ای، به بررسی سطح 8-OHdG و آنتی اکسیدان در بزاق کودکان تحت ارتودنسی ثابت پرداختند. این بیومارکرها یک و سه ماه بعد از درمان ارزیابی شدند. این مطالعه به دلیل بررسی اثر ژنوتوکسیسیته و سیتوتوکسیسیته کامپوزیت ها جهت چسباندن براکت انجام شد. نتیجه آنها نشان داد که دستگاه های ارتودنسی ثابت که با کامپوزیت باند می شوند باعث افزایش سطح 8-OHdG به عنوان مارکر سیتوتوکسیسیته نمی شود.

Honda و همکارانش^(۴۱) با فرض 8-OHdG به عنوان مارکر مهم برای ارزیابی صدمه اکسیداتیو DNA، با بررسی

بیماران RAS نتواند به آسیب DNA منجر شود. بنابراین با وجود مقالات ضد و نقیض در مورد نقش اتیولوژی استرس اکسیداتیو در بروز RAS مطالعه ای با تعداد نمونه بیشتر پیشنهاد می‌گردد. از طرفی به دلیل وجود عوامل مداخله کننده پیشنهاد می‌شود در مطالعات بعدی سطح 8-OHdG در بیماران RAS در دو فاز بهبودی و فعال سنجیده شود.

تشکر و قدر دانی

مقاله برگرفته از پایان نامه به شماره ۷۲۶ تخصصی می‌باشد. از همکاری و حمایت مالی معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران سپاسگزاری می‌گردد.

بیماران دچار بدخیمی‌های خونی به این نتیجه رسیدند که میزان 8-OHdG ادرار این افراد در مقایسه با افراد سالم افزایش یافته است. Kitada و همکارانش^(۴۲) آسیب اکسیداتیو DNA در اشکال مختلف بیماری‌های کبدی را محرز دانستند و افزایش 8-OHdG را در این بیماران گزارش کردند. با توجه به مطالعات ذکر شده به نظر می‌رسد بیماری‌های سیستمیک و انواع سرطان‌ها با کاهش قدرت دفاع آنتی اکسیدانی بدن می‌توانند باعث صدمه به DNA شوند. در این مطالعه تفاوت معنی دار آماری بین سطوح هیدروکسیدکسی گوانوزین (8-OHdG) در بیماران با استوماتیت آفتی راجعه و افراد سالم پیدا نشد، پس می‌توانیم بگوئیم ممکن است صدمه استرس اکسیداتیو در

منابع

1. Hamed S, Sadeghpour O, Shamsardekani MR, Amin G, Hajighasemali D, Feyzabadi Z. Common herb to cure the most common oral disease: stomatitis recurrent aphthous ulcer (RAU). Iran Red Crescent Med J 2016; 18(2): Article ID e21694.
2. Wardhana D E A. Recurrent aphthous stomatitis caused by food allergy. Acta Med Indones 42(4): 236-40.
3. Axéll T, Henricsson, The occurrence of recurrent aphthous ulcers in an adult: Swedish population. Acta Odontol Scand 1985; 43(2): 121-5.
4. Stanley HR. Aphthous lesions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1972; 30: 407-16.
5. Han J, He Z, Li K, Hou L. Microarray analysis of potential genes in the pathogenesis recurrent oral ulcer. Int Clin Exp Pathol 2015; 8(10): 12419-27 .
6. Natah SS, Kontinen YT, Enattah NS, shammakh NA, Sharkey A, and R. H ayriinen-Immonen Recurrent aphthousulcers today a review of the growing knowledge. Int J Oral Maxillo Facial Surg 2004; 33(3): 221-34 .
7. N.Jiang,L.Luo,L.Liu,X.Q.Sun,X.Jiang,andY.Cai. Soluble programmed death-1 and soluble programmed deathligand 1 protein expression and immune status in patients with recurrent aphthous ulcer. West China Journal Stomatology 2017; 35(3): 286-90.
8. Chen J, Ding WJ. Correlation between microbial andimmune mechanisms of recurrent oral ulcer and traditional Chinese medicine. Chinese Journal Experimental Traditional Medical Formulae 2016; 22(13): 202-7.
9. Z. X. Wang. Epidemiological analysis of gastrointestinal diseasesandrecurrentoralulcers. General Journal Of Stomatology 2016; 3(3): 148.
10. Akoglu G, MetinA, Kilinc F, Pektas SD, Isikoglu S, Akbas A, et al. Total serum oxidant/antioxidant status and arylesterase activity in recurrent aphthous stomatitis. Ann Dermatol 2013; 25(3): 273-7.
11. Murroy RK GD, Moyes PA, Rodwell VW. Harper's biochistry. 3th ed 1993.
12. Mahan, L Kathleen. Krause's food, nutrition and diet therapy. 11th ed: Elsevier 2004.
13. Haliwell B Gutteridge, John M C. Free radicals in biology and medicine. Fifth edition. England: Oxford University Press; 2015. 300-5.
14. Shigenaga M, Gimeno C, Ames B. Urinary 8-hydroxy-2 9-deoxyguanosine as a biological marker of in vivo oxidative DNA damage.Proc Natl Acad Sci U S A 1989; 86(24): 9697-701

15. Halliwell B, Gutteridge JM. Reactive Species and Antioxidants. Redox Biology Is a Fundamental Theme of Aerobic Life. *Plant Physiol* 2006; 141(2): 312–22
16. Matsui A, Ikeda T, Enomoto K, Hosoda K, Nakashima H, Omae K, et al. Increased formation of oxidative DNA damage, 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine, in human breast cancer tissue and its relationship to GSTP1 and COMT genotypes. *Cancer letters* 2000;151(1): 87-95.
17. Yano T, Shoji F, Baba H, Koga T, Shiraishi T, Orita H, et al. Significance of the urinary 8-OHdG level as an oxidative stress marker in lung cancer patients.. *Clin Chem Lab Med* 2009; 63(1): 111-4.
18. Kikuchi A, Takeda A, Onodera H, Kimpapa T, Hisanaga K, Sato N, et al. Systemic increase of oxidative nucleic acid damage in Parkinson's disease and multiple system atrophy. *Neurobiolo Dis* 2002; 9(2): 244-8.
19. Long JD, Matson WR, Juhl AR, Leavitt BR, Paulsen JS, Investigators P-H, et al. 8OHdG as a marker for Huntington disease progression. *Neurobiol Dise* 2012; 46(3): 625-34.
20. Ihara Y, Toyokuni S, Ichida K, Odaka H. Hyperglycemia causes oxidative stress in pancreatic beta-cells of GK rats, a model of type 2 diabetes. *Diabetes* 1999; 48(4): 927.
21. Wu LL, Chiou C-C, Chang P-Y, Wu JT. Urinary 8-OHdG: a marker of oxidative stress to DNA and a risk factor for cancer, atherosclerosis and diabetics. *Clinica Chimica Acta* 2004; 339(1): 1-9.
22. Mecocci P, Polidori MC, Cherubini A, Ingegneri T, Mattioli P, Catani M, et al. Lymphocyte oxidative DNA damage and plasma antioxidants in Alzheimer disease. *Arc neurol* 2002; 59(5): 794-8.
23. Cordis GA, Maulik G, Bagchi D, Riedel W, Das DK. Detection of oxidative DNA damage to ischemic reperfused rat hearts by 8-hydroxydeoxyguanosine formation. *J Mol Cell Cardiol.* 1998; 30(10): 1939-44
24. Kono Y, Nakamura K, Kimura H, Nishii N, Watanabe A, Banba K, et al. Elevated levels of oxidative DNA damage in serum and myocardium of patients with heart failure. *Circulation Journal* 2006; 70(8): 1001-5
25. Halliwell B, Whiteman M. Measuring reactive species and oxidative damage in vivo and in cell culture: how should you do it and what do the results mean? *Br J Pharmacol.* 2004; 142:231– 5
26. Brock GR, Butterworth CJ, Mathews JB, Chapple ILC. Local and systemic total antioxidant capacity in periodontitis and health. *J Clin Periodontol* 2004; 31: 515–52.
27. Terao J, Nagao A. Antioxidative effect of human saliva on lipid peroxidation. *Agric Biol Chem* 1991; 55(3):869-72.
28. Saral Y, Coskun BK, Ozturk P, Karatas F, Ayar A. Assessment of salivary and serum antioxidant vitamins and lipid peroxidation in patients with recurrent aphthous ulceration. *Tohoku J Exp Med* 2005; 206(4): 305-12.
29. Babae N, Hosseinkazemi H, Pouramir M, KhakbazBaboli O, Salehi M, Khadir F, et al. Salivary oxidant/antioxidant status and hematological parameters in patients with recurrent aphthous stomatitis. *Caspian J Intern Med* 2016; 7(1): 13-8.
30. Karıncaoğlu Y, Batcıoğlu K, Erdem T, Esrefoğlu M, Genc M. The levels of plasma and salivary antioxidants in the patient with recurrent aphthous stomatitis. *J Oral Pathol Med* 2005; 34(1): 7-12
31. Avci E, Akarslan Z, Erten H, Coskun-Cevher S. Oxidative stress and cellular immunity in patients with recurrent aphthous ulcers. *Braz J Med Biol Res* 2014; 47(5): 355-60.
32. Ramezani GH, Moghadam MM, Saghiri MA, Garcia-Godoy F, Asatourian A, Aminsobhani M, et al. Effect of dental restorative materials on total antioxidant capacity and calcium concentration of unstimulated saliva. *J ClinExp Dent* 2017; 9(1): 71-7.
33. Zhang T, Andrukhov O, Haririan H, Müller-Kern M, Liu S, Liu Z, Rausch-Fan X. Total Antioxidant Capacity and Total Oxidant Status in Saliva of Periodontitis Patients in Relation to Bacterial Load. *Front Cell Infect Microbiol* 2016; 5: 97.
34. Hegde AM, Rai K, Padmanabhan V. Total antioxidant capacity of saliva and its relation with early childhood caries and rampant caries. *J ClinPediatr Dent* 2009; 33(3): 231-4
35. Totan A, Miricescu D, Parlatescu I, Mohora M, Greabu M. Possible salivary and serum biomarkers for oral lichen planus. *Biotech Histochem* 2015; 90(7): 552-8
36. Moori M, Ghafoori H, Sariri R. Nonenzymatic antioxidants in saliva of patients with systemic lupus erythematosus. *Lupus* 2016; 25(3): 265-71.
37. Çağlayan F, Miloglu O, Altun O, Erel O, Yilmaz AB. Oxidative stress and myeloperoxidase levels in saliva of patients with recurrent aphthous stomatitis. *Oral Dis* 2008; 14(8): 700-4.
38. Momen-Beitollahi J, Mansourian A, Momen-Heravi F, Amanlou M, Obradov S, Sahebamee M. Assessment of salivary and serum antioxidant status in patients with recurrent aphthous stomatitis. *Med Oral patol Oral cir bucal* 2010;15(4):e557-61.
39. Khademi H, Khozeimeh F, Tavangar A, Amini S, Ghalayani P. The Serum and salivary level of malondialdehyde, vitamins A, E, and C in patient with recurrent aphthous stomatitis. *Adv Biomed Res* 2014; 3: 246.

40. Guler C, Toy E, Ozturk F, Gunes D, Karabulut AB, Otlu O. Evaluation of salivary total oxidant-antioxidant status and DNA damage of children undergoing fixed orthodontic therapy. *Angle Orthod* 2015; 85(2): 239-44.
41. Honda M, Yamada Y, Tomonaga M, Ichinose H, Kamihira S. Correlation of urinary 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG), a biomarker of oxidative DNA damage, and clinical features of hematological disorders: A pilot study. *Leuk Res* 2000; 24(6): 461-8
42. Kitada T, Seki S, Iwai S, Yamada T, Sakaguchi H, Wakasa K. In situ detection of oxidative DNA damage, 8-hydroxydeoxyguanosine, in chronic human liver disease. *J Hepatol* 2001; 35(5): 613-8