

واکنش‌های پریوستی و گزارش یک مورد

دکتر ماهرخ ایمانی مقدم

استادیار بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد

چکیده

مقدمه

تولید استخوان جدید، از تظاهرات اکثر بیماریهای استخوانی است که ممکن است از عناصر تشکیل دهنده استخوان نرمال (ترایکولها و پریوست) و یا از سلولهای تومور منشاء گرفته باشد. اگر چه تومورهای استخوان ساز و غضروف ساز به تنها می‌توانند استخوان جدید تولید کنند اما تعداد زیادی از نئوپلاسمها و همچنین عفونتها، ترومما و سایر بیماریها نیز می‌توانند باعث تحریک و تشکیل استخوان جدید بصورت واکنشی شوند. افتراق موارد فوق از یکدیگر سیار حائز اهمیت است.

هدف از این مقاله شناخت بیشتر انواع واکنشهای پریوستی است که در واقع در تشخیص افتراقی ضایعات مربوطه از نظر رادیولوژی کمک کننده می‌باشد. که در قالب مورد نادری از کیست باکال که با واکنش پریوستی همراه بود، ارائه شده است.

بحث و نتیجه‌گیری

اگر چه تکنیکهای تصویربرداری گوناگونی مثل CT، پانورامیک و رادیوگرافی پری آپیکال می‌توانند الگوی واکنش پریوستی را نشان دهند ولی در این مورد کیست باکال چیزی نشان ندادند و فعالیت پریوستی با نمای پوست پیازی در تکنیک اکلوزال کراس سکشنال بخوبی قابل مشاهده بود.

با توجه به بررسی انواع واکنش‌های پریوستی می‌توان دریافت که شناخت نمایهای رادیوگرافیک این واکنش‌ها و انتخاب تکنیک رادیوگرافی مناسب همراه با یافته‌های کلینیکی می‌تواند به تشخیص نهایی ضایعات استخوانی کمک نماید.

کلید واژه‌ها

واکنش پریوستی، کیست باکال، رادیوگرافی.

مقدمه

زمان تشکیل آنها تقسیم بندی می‌شوند:

۱- **تهاجم**: واکنش‌های پریوستی بسته به میزان برآمده شدن پریوست از حدود طبیعی خود بصورت مهاجم و نیمه مهاجم و غیرمهاجم طبقه بندی می‌شوند. واکنش مهاجم لزوماً متراوف بدخیمی نیست. بلکه به این معنی است که پیشرفت بیماری سریعتر از آن است که استخوان بتواند پاسخ بدهد. بسته به میزان تهاجم ضایعه، ناحیه زیر پریوست و بین الیاف شارپی ممکن است با استخوان جدید پر شود یا نه، ضایعاتی که مهاجم تر هستند پریوست را به سرعت از کورتکس و به مقدار بیشتری دور از کورتکس بلند و برآمده می‌کنند و فضای بیشتری برای تشکیل استخوان با نمای سوزنی^{*} شکل فراهم می‌کنند.

۲- **فعالیت**: واکنش پریوستی می‌تواند بصورت فعال و یا غیر فعال بسته به وضوح حدود و لبه‌های آن تقسیم بندی شود. یک واکنش غیرفعال دارای حدود مشخصی است و محل خاتمه پریوست و شروع بافت نرم بخوبی قابل تشخیص است. واکنش‌های پریوستی فعال دارای حدودی نامشخص و نامعلوم هستند و حدود واقعی پریوست به سختی قابل شناسایی است.

۳- **مدت زمان (سن ضایعه)**: مدت زمان پیدایش ضایعه می‌تواند اپاسیته نسبی واکنش پریوستی را تخمین بزنند. واکنش پریوستی جوان اپاسیته مشابه بافت نرم خواهد داشت. با گذشت زمان و افزایش سن ضایعه، این واکنش رادیو اپاکتر و مشابه استخوان می‌شود.^(۴)

انواع اختصاصی واکنش‌های پریوستی

واکنش‌های پریوستی در رادیوگرافی به دو صورت عمدۀ، با دانسیته ممتد و یکنواخت^{**} و یا منقطع و از هم گسیخته مشاهده می‌شوند.^(۵)

واکنش پریوستی ممتد و یکنواخت

این واکنش بصورت یک لایه منفردی از استخوان جدید که دانسیته یکنواختی داشته و ضخیم تر از یک میلیمتر است توصیف می‌شود. اختلافات قابل توجهی ممکن است از بیماری به بیمار دیگر مشاهده شود. این واکنش علامت یک پروسه خوش خیم می‌باشد. نکته اصلی در تشخیص راکسیون پریوستی یکنواخت تداوم آن است و اینکه برای هفته‌ها نسبتاً بدون تغییر

پریوست غشایی ضخیم از لایه‌های سلولی متعدد است که تقریباً تمام سطح هر استخوانی را می‌پوشاند. تنها قسمتهایی که توسط این غشاء پوشیده نمی‌شود، نواحی است که توسط غضروف پوشیده می‌شود پریوست علاوه بر پوشاندن استخوان و خونرسانی به آن در صورتیکه بطور مناسب تحریک شود باعث تولید استخوان نیز می‌شود.^(۱)

پریوست از دولایه تشکیل شده است یک لایه فیروز خارجی و یک لایه داخلی که لایه اخیر دارای خصوصیات استخوانسازی است و اگر سالم بماند می‌تواند تولید استخوان جدید در طول الیاف کوچک و عروق خونی بنماید.^(۲)

تروما، التهاب و عفونت شایعترین علل ایجاد واکنش پریوستی در اطفال و بزرگسالان است. نوپلاسمهای بدخیم اولیه استخوان گرچه نادر می‌باشند اما معمولاً همیشه باعث ایجاد واکنش پریوستی می‌شوند. در متاستازها نیز گاهی اوقات واکنش پریوستی مشاهده می‌شود. البته در بالغین و در دیگر استخوانهای بدن، واکنش‌های پریوستی به علل دیگری همچون رتیکولوزیس و استئوآرتروپاتی ریوی نیز بطور نادر می‌تواند ایجاد شود. در نوزادان سیفلیس مادرزادی و بیماری کافئی نیز می‌باشد مورد توجه قرار گیرد. لوسومی، آنمی‌های اریتروپلاستیک (در مهاجران) و اسکوربوت نیز از علل احتمالی ایجاد واکنش پریوستی می‌باشند. تومور اوینگ و متاستازهای ناشی از نوروبلاستوما سایر عواملی هستند که در دوران کودکی باعث ایجاد این واکنش می‌شوند.^(۴,۵)

واکنش‌های پریوستی بطور شایع در ضایعات استخوانی ایجاد می‌شوند و شناسایی انواع الگوهای آنها از نظر رادیولوژیکی کمک بسیار بزرگی به تشخیص این ضایعات می‌کند. هدف از این مقاله شناخت بیشتر علل و انواع واکنش‌های پریوستی و گزارش یک مورد کیست با کمال عفونی که باراکسیون پریوستی همراه بوده می‌باشد.

طبقه بندی واکنش‌های پریوستی
واکنش‌های پریوستی بسته به میزان تهاجم، فعالیت و مدت

* Spiculated

** Solid

واکنش‌های پریوستی از هم گسیخته و منقطع

این واکنش‌ها یکنواخت نیستند و دارای اشکال متفاوتی می‌باشند و در رادیوگرافی نماهای مختلفی دارند نمای لایه-لایه یا پوست پیازی و یا عمودی و اشعه خورشیدی مثالهای کلاسیکی از این نوع واکنش‌ها می‌باشد که بصورت برآمدگی پریوست بدنیال بیماریهای فعال (تومورهای بدخیم، عفونتها، خونریزیهای مکرر) ایجاد می‌شوند. از مشخصات برجسته واکنش‌های پریوستی منقطع، ناپایداری و بسی ثباتی آن است و نمای رادیوگرافی آنها پیوسته در حال تغیر است. حرکه‌ای مهاجم تر باعث تغییر بیشتر راکسیون پریوستی بصورت هفت‌به هفت‌ه و بعضی مواقع حتی تغییرات بصورت روزانه ایجاد می‌شود.^(۳)

در پرسه‌های با رشد سریع پریوست نمی‌تواند تولید استخوان جدید متناسب با سرعت رشد ضایعه بکند. بنابراین بجای پtern یکنواخت ما نمای از هم گسیخته مشاهده می‌کنیم. این پtern به چگونگی رشد و توقف ضایعه بستگی دارد.^(۱) در زیر به شرح

انواع واکنش‌های از هم گسیخته می‌پردازیم:

واکنش پریوستی لایه لایه

این واکنش نمای لایه لایه یا پوست پیازی داشته و نشان دهنده برآمدگی پریوست بصورت دوره‌ای و یا متناوب است این نما معمولاً نشان دهنده یک ضایعه نیمه مهاجم است و می‌تواند همراه با انواع استئومیلیت و بعضی از تومورها دیده شود.^(۴) اگر تومور رشد دوره‌ای داشته باشد (مانند سارکوم اوینگ) لایه‌هایی از استخوان جدید پریوستی در زیر قرار می‌گیرند و یک نمای لایه لایه و یا پوست پیازی ایجاد می‌کند.

اگرودای ناشی از یک ضایعه آماسی می‌تواند پریوست را از روی استخوان کورتیکال بلند کرده و سپس باعث تحریک پریوست و تشکیل استخوان جدید شود. هنگامیکه این پدیده بیشتر از یکبار اتفاق یافتد باعث ایجاد نمای پوست پیازی می‌شود که در رادیوگرافی قابل مشاهده است (تصویر ۱) این پدیده بطور شایع در ضایعات التهابی دیده می‌شود و در بعضی از ضایعات بدخیم (مانند لوسمی) و در هیستیوستیوزیس Langerhan's cell نادر است. Dagenais و Pharooh (سال ۱۹۹۲) در مطالعه‌ای بر روی

باقی می‌ماند.

اندازه و ضخامت آن ممکن است افزایش یابد اما یکنواختی دانسیته رادیوگرافی آن به مقدار جزئی تغییر می‌کند این واکنش از بیماری به بیمار دیگر بسته به طبیعت و مدت بیماری متغیر است بعنوان مثال در یک فرد مبتلا به اتوزینوفیلیک گرانولوما ممکن است واکنش پریوستی بصورت لایه نازکی از استخوان جدید باشد، در حالیکه در فرد دیگر این واکنش برجسته تر بوده و همراه با پاسخ پریوستی ضخیم‌تری می‌باشد. اما در هر دو مورد نمای استخوان جدید یکنواخت و متعددالشكل می‌باشد.

در پرسه‌های با رشد آهسته پریوست زمان کافی برای پاسخ به آن را دارد. در نتیجه می‌تواند تولید استخوان جدید متناسب با سرعت رشد ضایعه بکند. بنابراین استخوان جدید پریوستی بصورت یکنواخت در طول لبه‌های استخوان مبتلا مشاهده می‌شود.^(۵)

واکنش یکنواخت ممکن است ضخیم یا نازک، صاف و یا ناهموار دارای اپاسیته متغیر، حدود مشخص و یا نامشخص باشد. شکل اپاسیته دلالت بر مدت زمان و سن پرسه و احتمالاً تهاجم اولیه آن می‌کند اگر سطح واکنش پریوستی صاف و مشخص باشد، ضایعه ترمیم شده و یا در حال ترمیم است و می‌بایست بصورت غیربرجسته و غیرفعال طبقه بندی شود. اگر حدود واکنش نامشخص باشد بصورت فعال طبقه بندی می‌شود. واکنش‌های پریوستی یکنواخت معمولاً پرسه‌ایی غیرمهاجم و احتمالاً نیمه مهاجم می‌باشند.^(۶)

واکنش یکنواخت معمولاً مشخصه یک بیماری خوش‌خیم است اما گاهی بمندرت همراه ضایعات بدخیم (لفوسارکوم) نیز مشاهده می‌شود. در میان ضایعاتی که بطور شایع تولید استخوان جدید پریوستی از نوع یکنواخت می‌کند می‌توان اتوزینوفیلیک گرانولوما، استئومیلیت، شکستگیها، بیماریهای عروقی، خونریزیهای استئوما، استئو آرتروپاتی ریوی و بیماریهای متابولیکی را نام برد.^(۷)

تیغه‌های نازک و بلند بر عکس نشانه یک پروسه با تهاجم بیشتر است.^(۲)

اگر ضایعه رشد سریع و ثابتی داشته باشد، پریوست نمای کاملاً متفاوتی ایجاد می‌کند که گاهی اوقات نمای اشعه خورشیدی^{*} و یا شبیه بقایای موهای کوتاه شده^{**}، نامیده می‌شود.^(۱) البته در نمای اشعه خورشیدی تیغه‌ها ضخیم و نامنظم بوده در حالیکه در نمای شبیه بقایای موهای کوتاه شده تیغه‌های استخوانی نازک تر بوده و بطور منظم تری در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. نمای اشعه خورشیدی نشانه یک پروسه مهاجم است. استئوسارکوم و تومور اوینگ^{***} تمایل به ایجاد نمای اشعه خورشیدی دارند. (تصویر ۲)

کندروسارکوم و فیبروسارکوم فعالیت پریوستی کمتری را نشان می‌دهند. نمای اشعه خورشیدی ممکن است همراه آنژیوما و تالاسمی نیز دیده شود، اما معمولاً منظم تر است. این نما همچنین در تومورهای متاستاتیک غده پرتوستات و نوروبلاستوما نیز مشاهده می‌شود.^(۴)

واکنش پریوستی بدون شکل

تومورهای بد خیم علاوه بر اینکه باعث ایجاد نمای لایه لایه و یا تیغه‌های عمود بر استخوان می‌شوند اغلب باعث ایجاد توده‌های کلسفیه‌ای می‌شوند که شکل مشخصی بخود نمی‌گیرد و بطور عمدۀ بین استخوان جدید پریوستی و کورتکس استخوان میزان قرار می‌گیرند این رسوبات بی شکل ممکن است از یک تومور استخوانی و یا از پاسخ پریوست به تومور ناشی شده و اغلب به اشکال کروی یا بیضوی هستند و از نظر اندازه از چند میلیمتر تا چند سانتیمتر در برش عرضی متفاوت می‌باشند. این واکنشها معمولاً دلالت بر بد خیمی دارند و بندرت ممکن است با تومورهای خوش خیم استخوانی همراه شوند. حدود واکنش پریوستی معمولاً کمتر مشخص می‌باشد و این نما نسبت به سایر واکنش‌های پریوستی کمترین نظم و ترتیب را دارد و نشانه یک پروسه مهاجم می‌باشد. معمولاً نواحی از تحلیل استخوان همراه با ضایعه مشاهده می‌شود و استخوان جدید معمولاً بصورت تجمعی ابری شکل و یا بصورت رشته‌های به هم پیچیده نمایان است و

۲۹ بیمار مبتلا به هیستوستیوزیس X فکین نشان دادند که واکنش پریوستی می‌تواند یک مشخصه خوب برای شناسایی هیستوستیوزیس X باشد. شناخت حضور این واکنش به مقدار زیادی بستگی به تکنیکهای رادیوگرافی قابل دسترس برای مطالعه دارد.^(۷)

در مطالعه‌ای که Nortje و Wood در سال ۱۹۸۸ بر روی واکنش پریوستی در بیماران مبتلا به استئومیلت انجام دادند، نشان داده شد که تعداد لایه‌های پریوستی جدا از هم در این بیماران بین ۱-۱۲ لایه بود. تعداد لایه‌ها با سن بیماران در ارتباط نبود و ممکن است بدلیل فاکتورهای باکتریایی باشد و در ارتباط با واکنش پریوستی نمی‌باشد.^(۶)

واکنش پریوستی ندولر لایه‌ای

یک واکنش پریوستی موازی و یا لایه-لایه است که بصورت منقطع و از یک تعداد بیشتری لایه تشکیل شده است در قسمت سطحی این لایه‌ها، در ناحیه‌ای دور از استخوان، دانسیته‌های ندولر متصل به هم وجود دارد. این نما تقریباً بطور تغییر ناپذیر به معنی حضور یک ضایعه خوش خیم و بطور شایع استئومیلت و یا اوزینوفیلیک گرانولوما بوده و به شناسایی آنها از سارکوم اوینگ و سایر تومورهای با سلول گرد^{*} کمک می‌کند. محققین این واکنش را در سایر تومورهای خوش خیم مانند استئوبلاستوما نیز مشاهده کرده‌اند. البته این واکنش ممکن است هنگامیکه یک تومور بد خیم عفونی شده باشد (بعد از بیوپسی) و یا بعد از درمان نیز وجود داشته باشد.^(۳)

واکنش پریوستی با تیغه‌های عمودی

این واکنش بدلیل رشد استخوان جدید، عمود بر صفحه استخوان میزان ایجاد می‌شود. معمولاً این واکنش توسط یک تومور بد خیم که پریوست را بلند می‌کند ایجاد می‌شود. عقیله Harmon و Brunschwing تشکیل استخوان جدید در طول الیاف شاربی صورت می‌گیرد و نمای تیغه‌های نازک سوزن مانند ایجاد می‌کند این نما معمولاً نشانه یک ضایعه نیمه مهاجم تا مهاجم است. تیغه‌های کوتاه و ضخیم نشانه یک پروسه با تهاجم کمتر و

* Round cell tumors

** Sunray

*** Hair-on-end

پریوستی و شیوع آنها در استخوانهای فک برای چگونگی کاربرد آنها در تشخیص افتراقی ضایعات استخوانی یک مورد کیست باکال را که با واکنش پریوستی همراه بود به همراه توصیف رادیوگرافیک و شرح بالینی آن مطرح نموده و تشخیص افتراقی می‌نماییم.

کیست (BBC) Buccal Bifurcation

این کیست به اسامی مختلفی مانند کیست باکال عفونی مندیبول، کیست پارادنتال و یا کیست دندانی عفونی یک طرفه نامیده می‌شود. منشاء اپتیلیوم آن احتمالاً رشته‌های اپی تلیالی پریودنشیوم ناحیه انشعاب ریشه‌های مولرهای مندیبول است، نمای هیستوپاتولوژیک آن اختصاصی نیست. ایتوولوژی آن ناشناخته است یک تئوری التهاب را محرك ایجاد آن می‌داند اما التهاب همیشه وجود ندارد. سازمان بهداشت جهانی این کیست را جزو کیستهای التهابی طبقه بندی کرده است.

شایع‌ترین علت حضور این کیست فقدان و یا تاخیر در رویش اولین یا دومین مولر فک پایین است در معاینه کلینیکی دندان مولر ممکن است غایب باشد و یا کاسپ لینگوال آن بطور غیرطبیعی بطرف مخاط باکال رانده شده و بلندتر از موقعیت کاسپ باکال آن قرار گرفته باشد. ابتلاء اولین مولر مندیبول بیشتر از دومین مولر است یک تورم سخت ممکن است در قسمت باکال ناحیه مولر درگیر وجود داشته باشد و دندانهای ناحیه مبتلا همیشه زنده می‌باشند و اگر کیست بطور ثانویه عفونی شود بیمار درد نیز خواهد داشت سن ابتلاء برای BBC دو دهه اول زندگی و برای کیست پارادنتال سومین مولر دهه سوم زندگی است.

گاهی اوقات این کیست بطور دو طرفه اتفاق می‌افتد و همیشه در ناحیه باکال و انشعابات ریشه‌ای دندان مولر قرار می‌گیرد در رادیوگرافی پری آپیکال و پانورامیک ضایعه ممکن است کمی دیستال به محل انشعاب ریشه دندان مبتلا قرار گیرد و در بعضی موارد از نظر رادیولوژیکی حدود آن به آسانی مشخص نیست و ضایعه ممکن است بصورت یک ناحیه رادیولوست بر روی تصویر ریشه‌های مولر بیفتد. در سایر موارد دارای حدودی مشخص و حاشیه استخوانی است. بیشترین مشخصه تشخیصی

ممکن است با نمای سوزنی شکل نیز همراه باشد. حضور این واکنش به افتراق تومورهای اولیه استخوانی از تومورهای متاستاتیک کمک می‌کند زیرا تومورهای متاستاتیک بندرت باعث واکنش پریوستی و یا رسوبات بی‌شکل خارج استخوانی می‌شوند. مگر اینکه با یک شکستگی پاتولوژیک همراه شده باشد. البته بدخیمی پریوستات و دستگاه گوارش از موارد استثناء قابل توجه هستند.^{(۱) و (۲)}

مثلث کدمن (Codman)

مثلث Codman اولین بار توسط Ribbert در سال ۱۹۱۴ توصیف شد. او معتقد بود که این مثلث بدنیال برآمدگی پریوست بدلیل یک توده توسعه یافته ایجاد می‌شود.^(۳) البته مثلث کاملی وجود ندارد هنگامیکه یک پروسه رشد سریعی دارد، پریوست لایه نازکی از استخوان جدید تولید می‌کند که بعضی اوقات فقط لبه‌های پریوست بلند و استخوانی خواهد شد. هنگامیکه این مقدار جزئی از استخوانسازی مماس به اشعه X در رادیوگرافی باشد، این نما یک زاویه کوچک با سطح استخوان تشکیل می‌دهد، اما یک مثلث کامل نیست (تصویر ۳)^{(۴) و (۵)}. این نما مدت‌ها بصورت تظاهراتی از یک بیماری بدخیم استخوانی مورد توجه قرار می‌گرفت. اما امروزه محققین دریافتند که این نما بدنیال هر ضایعه‌ای (چه خوش خیم و بدخیم) که پریوست را بلند می‌کند می‌تواند اتفاق بیفتد.^(۶)

یک واکنش پریوستی مهاجم ممکن است بصورت مثلث کدمن مشاهده شود. تولید استخوان جدید در ناحیه معمولاً بصورت یک واکنش یکنواخت است. این نما نمی‌تواند برای یک تومور پاتوگنومیک باشد اما نشانه واکنش مهاجمی است که پریوست را بسرعت از روی کورتکس بلند می‌کند.^(۷)

یک واکنش پریوستی منقطع و غیریکنواخت نیز ممکن است بصورت نمای اشعه خورشیدی و یا پوسٹ پیازی و یا مثلث کدمن نمایان شود. این نماها بصورت شایع در تومورهای اولیه بدخیم و پروسه‌های غیربدخیم با درجه تهاجم زیاد مشاهده می‌شوند.^(۸)

با توجه به شناخت علل و انواع گوناگون واکنش‌های

و اکلوزال و پری آپیکال گرفته شد (بعلاوه قبل از بیمارسی تی اسکن در مقاطع مختلف گرفته شده و برای بیمار تشخیص کیست گذاشته شده بود).

در رادیوگرافی پانورامیک بیمار ضایعه‌ای رادیولوستنت اینترادیکولار با حدودی کم مشخص در ناحیه آپکس و محل انشعاب ریشه اولین مولر مندیبول مشاهده شد. در رادیوگرافی اکلوزال انحراف ریشه‌های دندان به سمت کورتکس لینگوالی و راکسیون پریوستی با نمای پوست پیازی مشخص بود. (تصاویر ۴۵ و ۴۶).

با توجه به یافته‌های کلینیکی و رادیولوژیکی موجود برای بیمار در تشخیص افتراقی موارد: کیست تروماتیک عفونی، کیست باکال عفونی، هیستوسیتوزیس X و پریوستیت پرولیفراتیو، ژانت سل گرانولوماتی مرکزی و سارکوم اوینگ مطرح شد. در بیوپسی بعمل آمده از بیمار آبسته مزمن منتشر بصورت خفرات شیبی کیست با جدار همبندی مملو از کاپیلهای خونی و اگزودا و ارتشاح سلولهای آماسی حاد و مزمن با برتری لنفوپلاسموسیت و همچنین در برخی نواحی وجود پوشش اپیتلیالی شبیه مالاسه با رشد طاق نصرتی گزارش شد و بالاخره برای بیمار تشخیص نهایی کیست باکال مندیبول گذاشته شد.

بحث و نتیجه گیری

بر اساس نظریه Moser و Madewell واکنش پریوستی نشانه فعالیت بیولوژیکی استخوان است و تومور، عفونت، التهاب و ترومما شایع ترین علل ایجاد این واکنش‌ها هستند. شناخت الگوهای رادیوگرافیک آنها در افتراق این عوامل از یکدیگر بسیار ضروری است. بعنوان مثال هنگامیکه نمای یکنواخت در یک واکنش مشاهده می‌شود حدود ۹۵-۹۰ درصد موارد می‌توانیم انتظار یک پرسه خوش خیم را داشته باشیم، در حالیکه مشاهده نمای از هم گسیخته این واکنش‌ها (بخصوص نمای Spiculated و Amorphous) می‌تواند زنگ خطری برای حضور یک تومور بدخیم باشد.

در بررسی موارد تشخیص افتراقی مطرح شده برای بیمار باستی به نکات زیر توجه کرد:

BBC انحراف دندان مولر مبتلا است بطوریکه نوک ریشه‌ها بطرف کورتیکال پلیت لینگوالی مندیبول و سطح اکلوزال دندان به طرف سطح باکال مندیبول رانده می‌شود این انحراف ممکن است در رادیوگرافی پری آپیکال و پانورامیک قابل مشاهده باشد. بهترین رادیوگرافی برای نشان دادن این حالت تکینک اکلوزال کراس سکشنال فک پایین است. که وضعیت غیرطبیعی آپکس ریشه را مشخص می‌کند اگر کیست به اندازه کافی بزرگ باشد باعث جابجایی و تحلیل دندان مجاور می‌شود، در مواردیکه کیست بطور ثانویه عفونی شود، استخوان جدید پریوستی در کورتکس باکال مجاور دندان مبتلا تشکیل خواهد شد.

تشخیص کیست باکال عمدتاً بر اساس یافته‌های کلینیکی و رادیوگرافیک استوار است تشخیص افتراقی عمدتاً شامل ضایعاتی است که منجر به پاسخ پریوستی آماسی بر روی سطح باکال مولرهای مندیبول می‌شود (مانند یک آسسه پریوتنال یا هیستوسیتوزیس Langerhan's Cell) تنها افتراق این ضایعات از یکدیگر این است که فقط این کیست باعث کج شدن دندان مولر می‌شود همچنین در تشخیص افتراقی کیست دنتی ژوروس نیز مطرح می‌شود اما کیست باکال اطراف تاج دندان را احاطه نمی‌کند، و عود ندارد و دندان مبتلا بایستی حفظ شود.^(۶)

گزارش مورد

پس بچه‌ای ۸ ساله ساکن بجنورد با شکایت تورم سمت چپ صورت به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال ۱۳۷۸ ارجاع داده شد. در معاینه داخل دهانی بیمار ضایعه‌ای با قوام سخت استخوانی در ناحیه D-6 که در لمس در زیادی داشته مشاهده شد. دندانهای این ناحیه لقی نداشته و در معاینه خارج دهانی دو ندول لتفاوی متخرک و سفت و در لمس حساس در سمت چپ گردن به اندازه ۱×۱ cm با قوام سفت و یک ندول در سمت راست به اندازه کمتر از ۰/۵ cm قابل لمس بود. بیمار آگاهی دقیقی از زمان شروع ضایعه نداشته و شروع آنرا حدود یک هفته قبل ذکر می‌کرد. در تاریخچه بیمار سابقه ترومما (افتادن از اسب) مشهود بود. از بیمار رادیوگرافی‌های پانورامیک

ایجاد می‌کند در افراق این نما از هیستیوستیوزیس X و استئومیلیت گاره بایستی توجه داشت که نمای لایه در سارکوم اوینگ معمولاً همراه با نواحی از تخریب کورتکس است.

علت ایجاد واکنش پریوستی در کیست باکال مطرح شده بدلیل فعل بودن پریوست در اطفال و اضافه شده عفونت از طریق پاکت پریودنتال دیستاند دندان $\overline{6}$ به کیست بوده است.

انتخاب تکنیک رادیوگرافی مناسب نیز برای شناسایی الگوی واکنش‌های پریوستی بسیار حائز اهمیت است بعنوان مثال در مورد کیست باکال گزارش شده، تکنیک سی تی اسکن، پانورامیک و رادیوگرافی پری آپیکال واکنش پریوستی را نشان ندادند. در صورتیکه فعالیت پریوستی با نمای پوست پیازی در تکنیک اکلوزال کراس سکشنال فک پایین بخوبی قابل مشاهده بود.

بنابراین آگاهی از انواع الگوهای فعالیت پریوستی و انتخاب تکنیک رادیوگرافیک مناسب همراه با یافته‌های کلینیکی بیمار می‌تواند ما را به تشخیص نهایی ضایعات استخوانی نزدیکتر نماید.


کیست تروماتیک بندرت باعث تورم کورتکس (باشتنه کیستهای بزرگ) و واکنش پریوستی می‌شود.

در اوزینوفیلیک گرانولوما ضایعات داخل استخوانی منفرد بوده و بیشتر در خلف مندیبل بخصوص ناحیه راموس شایع می‌باشد این ضایعات معمولاً دارای حدودی مشخص بوده و توانایی ایجاد واکنش پریوستی با نمای لایه را داشته که با واکنش پریوستی ناشی از ضایعات التهابی غیرقابل شناسایی می‌باشد.


پریوستیت پرولیفراتیو یا استئومیلیت گاره غالباً بدنال یک عفونت دندانی (مولر اول فک پایین) ایجاد می‌شود. وجود رادیولوسنسی پری آپیکال با حدود نامشخص در ناحیه دندان مبتلا و واکنش پریوستی با نمای پوست پیازی از مشخصات برجسته رادیوگرافیک این ضایعه است.

جابجایی دندانها و یا تحلیل ریشه دندانهای مجاور و تورم کورتکس خارجی فک بدون ایجاد واکنش پریوستی معمولاً از خصوصیات ژانت سل گرانولومای مرکزی است.

سارکوم اوینگ قادر به تحریک پریوست و تولید استخوان جدید است اما نمای شایع آن مثلث کدمن و نمای اشعه خورشیدی می‌باشد و بندرت واکنش پریوستی از نوع لایه



تصویر ۱: در رادیوگرافی پانورامیک بیمار مبتلا به استئومیلیت وجود حداقل دو لایه از استخوان جدید (فلش‌ها) تولید شده توسط پریوست در ناحیه لبه تحتانی مندیبل قابل مشاهده است.



تصویر ۲ : در رادیوگرافی از مندیبول رذکسیون شده بیمار مبتلا به استئوسارکوما، اسپیکولهای ظریف استخوانی (فلش‌ها) در لبه فوقانی استخوان آلوئل قابل مشاهده است.



تصویر ۳ : نمای شماتیک مثلث کدمن، تومور پریوست را از روی استخوان بلند کرده و استخوان جدید بین تومور و پریوست برآمده، قرار می‌گیرد.




تصویر ۴ : ←



تصویر ۵: تصاویر CT در مقطع اگزیالی expansion کورتکس باکال در ناحیه سمت چپ بیمار را نشان می‌دهد.



تصویر ۶: در رادیوگرافی پانورامیک، رادیولوستی ایتررادیوکولار با حدود کم مشخص در ناحیه مولر اول قابل مشاهده است.



تصویر ۷: در رادیوگرافی اکلوزال کراس سکشنال، واکنش پریوستی با نمای پوست پیازی در ناحیه کورتکس باکال مشاهده می‌شود.

منابع

1. Ragsdale BD,Madewell JE,Sweet DE.Radiologic analysis of solitary bone lesions. Part II,periosteal reactions. J Radiol clin North,Am 1981;19:749-83.
2. Kari L.Anderson. Introducation to musculoskeletal radiology,musculoskeletal systems course.Lecture 1,Fall : 2001;P.1-16.
3. Edeiken J,Dalinka M.Diagnosis of diseases of bone.Vol.1,Baltimore: Williams and wilkins;1990 .P.11-31.
4. Sutton D.Textbook of radiology and medical imaging .vol.1, 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone;1993.P.45-47.
5. Dagenasis M,Pharoah MJ.The radiographic characteristics of histiocytosis X. Oral Surg Oral Med Oral pathol 1988;66:249-60.
6. White SC,Pharoah MJ.Oral radiology principles and interpretation,4th ed.St. Louis: Mosby Co; 2000.P.361-65,267-69.
7. Yu Q,wang PZ,Sun DX.Radiographic findings in langerhan's cell disease affecting the mandible. Oral Surg Oral Med Oral pathol 1995;79:251-54.
8. Nortje CJ,wood RE.Periostitis ossificans versus Garre's osteomyelitis part II, radiologic analysis of 93 cases in the jaw. Oral Surg Oral Med Oral pathol 1988;66:249-60.
9. Yoshiura K,Hijiya T,Ariji E.Radiographic patterns of osteomyelitis in the mandible. Oral Surg Oral Med Oral pathol 1994;78:116-24.
10. Delbalso AM.Maxillofacial Imaging. 1st ed . Philadelphia: W.B.Saunders Co;1990.P.356-61.

Periosteal Reactions and A Case Report

Imani Moghaddam M. D. D. S., Radiologist

Assistant Professor, Dept. of Oral and Maxillofacial Radiology, Dental School Mashhad University of Medical Sciences, Iran

Introduction: New bone productions, a frequent feature in many bone diseases , may originate from normal bone forming elements (trabeculae and periosteum) or from tumor cells. Although osteogenic and chondrogenic tumors alone are able to produce new bone, some neoplasms, infections, trauma and some other diseases can initiate reactional osteogenesis. It is of paramount importance to distinguish one from the other.

The purpose of this study was recognition of different types of periosteal reactions which are helpful in differential diagnosis radiologically. Here is a report of a rare case of buccal cyst with periosteal reaction.

Results : The CT scan technique, panoramic and periapical radiography didn't show the periosteal reaction in this buccal cyst and periosteal activity with onion-skin pattern was well apparent in cross-sectional occlusal technique.

Conclusion: Regarding the overview of different periosteal reactions, it can be concluded that the recognition of different radiographic patterns and choosing the proper radiographic technique accompanied with clinical finding, helps us in final diagnosis of bony lesions.

Key words : Periosteal Reaction,Buccal cyst, Radiography.